



Protejați-vă copilul cu ajutorul vaccinului împotriva tusei convulsive

Administrarea vaccinului împotriva tusei convulsive în timpul sarcinii vă va proteja copilul.

Vaccinul este gratuit la cabinetul medicului dumneavoastră de familie.*

Cea mai potrivită perioadă pentru administrarea vaccinului este între săptămânile 16 și 36 de sarcină.

Prin administrarea vaccinului împotriva tusei convulsive în timpul sarcinii, vă puteți asigura că copilul dumneavoastră este protejat din momentul în care se naște.

Contactați medicul dumneavoastră de familie pentru a face o programare.

* Vaccinul este gratuit la cabinetul medicului dumneavoastră de familie. Cu toate acestea, dacă medicul dumneavoastră de familie deține o clinică privată, acesta poate percepe o taxă pentru consultația în cadrul căreia vi se va administra vaccinul.

Ce este tusea convulsivă (pertussis)?

Tusea convulsivă (sau pertussis) este o boală foarte contagioasă care poate pune viața în pericol.

Infecția afectează cel mai grav copiii cu vârste sub 6 luni. Mulți copii cu tuse convulsivă sunt internați în spital cu complicații precum pneumonie și leziuni cerebrale.

Copiii cu vârste sub 6 luni sunt prea mici pentru a fi vaccinați complet. De aceea este important să vă pregătiți în avans și să administrați vaccinul în timpul sarcinii.

Care sunt simptomele?

Tusea convulsivă provoacă crize de tuse și sufocare îndelungate, îngreunând respirația.

Sunetul „convulsiv” este cauzat de efortul de a trage aer în piept între accesele de tuse. După un acces de tuse convulsivă, un copil poate să se învinețească din cauza lipsei aerului sau să vomite.

Nu toți copiii tușesc convulsiv și, adesea, copiii mai mari și adulții nu prezintă decât o simplă tuse.

Tusea poate dura până la 3 luni. Dacă copilul dumneavoastră a suferit de tuse convulsivă, acest lucru nu înseamnă că nu poate contracta boala din nou.

Puteți citi despre vaccinarea copilului dumneavoastră la pagina 10 a acestui prospect.

Cum se răspândește?

Tusea convulsivă se răspândește de la o persoană la alta prin tuse, strănut sau contact apropiat.

O persoană care prezintă tuse convulsivă poate răspândi infecția pe o perioadă de până la 3 săptămâni după apariția tusei.

Mulți copii care contractează tusea convulsivă au intrat în contact cu membri ai familiei care aveau tusea de mai mult de 2 săptămâni.

Cum poate fi prevenită?

Cel mai bun mod de a preveni tusea convulsivă este vaccinarea.

Dacă sunteți însărcinată, medicul dumneavoastră de familie vă poate administra gratuit vaccinul împotriva tusei convulsive între săptămânile 16 și 36 de sarcină.

Dacă ați ajuns recent în Irlanda dintr-o altă țară, ar trebui să vă vaccinați împotriva tusei convulsive în timpul sarcinii pentru a vă proteja copilul.

Administrarea vaccinului poate comporta riscul apariției tusei convulsive?

Nu. Vaccinul contra tusei convulsive nu vă poate îmbolnăvi de tuse convulsivă, întrucât acesta nu conține bacterii vii.



Cum mă protejează vaccinul administrat în timpul sarcinii pe mine și pe bebelușul meu?

Vaccinul stimulează sistemul imunitar să producă un nivel ridicat de anticorpi împotriva bacteriilor specifice tusei convulsive. De asemenea, anticorpii vor trece la bebeluș în perioada intrauterină și îl vor proteja în timpul primelor sale luni de viață.

Este cunoscut acum faptul că bebelușii ai căror mame s-au vaccinat contra tusei convulsive în timpul sarcinii prezintă un risc mult mai redus de a contracta tusea convulsivă în primele luni de viață.

Am fost vaccinat împotriva tusei convulsive la vârsta copilăriei, trebuie să mă vaccinez din nou?

Da. Este foarte important să vă vaccinați în timpul sarcinii. Vaccinul din timpul sarcinii are rolul de a vă proteja bebelușul.

Când ar trebui să mă vaccinez?



Puteți să vă vaccinați contra tusei convulsive între **săptămânile 16 și 36** de sarcină.

Nu există multe motive pentru care vaccinarea nu ar trebui să aibă loc mai târziu. Vaccinarea poate fi reprogramată în cazul în care nu vă simțiți bine și temperatura corporală este mai mare de 38 °C.

Care este denumirea vaccinului contra tusei convulsive administrat în sarcină?

Vaccinul administrat în sarcină pentru a proteja împotriva tusei convulsive se numește vaccin Tdap.

Este o doză mică de rapel al vaccinului pentru a vă proteja împotriva:

- ✓ tetanosului (T)
- ✓ difteriei (d)
- ✓ pertussisului acelușar (ap) (tuse convulsivă)

Trebuie să mi se administreze vaccinul la fiecare sarcină?

Da. Numărul de anticorpi pe care îi dezvoltați după vaccinare scade de-a lungul timpului. Aceasta înseamnă că trebuie să vi se administreze vaccinul la fiecare sarcină. Apoi puteți produce anticorpii care vor trece la copilul dumneavoastră în perioada intrauterină..

La ce mă pot aștepta după vaccinare?

Este posibil să apară roșeață sau să simțiți durere în jurul locului în care vi s-a administrat injecția. Este posibil să prezentați o reacție ușoară, generală, cum ar fi febră și oboseală, pe parcursul primelor 48 de ore.

Ce trebuie să fac dacă nu mă simt bine?

Dacă faceți febră în urma vaccinării, puteți lua paracetamol. **Nu luați ibuprofen sau aspirină** pentru a trata febra care apare după vaccinare în timpul sarcinii.

Rețineți că, dacă nu vă simțiți bine după ce vă este administrat vaccinul, acest lucru ar putea avea alte cauze – nu presupuneți că este un efect al vaccinului. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă este necesar.

Raportarea efectelor secundare

În cazul în care considerați că experimentați un efect secundar după administrarea vaccinului, puteți raporta acest lucru către Autoritatea de reglementare a produselor pentru îngrijirea sănătății (HPRA) accesând www.hpra.ie.

De asemenea, medicul dumneavoastră, asistenta medicală, farmacistul sau un membru al familiei pot raporta efectul secundar către HPRA.

Prezintă siguranță pentru femeile însărcinate să fie vaccinate?

Da. Vaccinul poate fi administrat în siguranță în timpul sarcinii. Vaccinul contra tusei convulsive este recomandat pentru femeile însărcinate din Irlanda și alte țări, precum Marea Britanie, SUA, Noua Zeelandă și Australia.

Administrarea vaccinului contra tusei convulsive a fost studiată la femeile însărcinate, nefiind constatat niciun risc. Reacțiile adverse sunt în general minore, iar efectele secundare grave apar foarte rar.

Există persoane cărora nu ar trebui să le fie administrat vaccinul contra tusei convulsive?

Nu se recomandă administrarea vaccinului în cazul în care:

- ați avut o reacție alergică severă (anafilaxie) la o doză anterioară de vaccin contra tusei convulsive sau la orice componentă a acestuia.
- brațul vi s-a umflat și ați experimentat durere după o doză anterioară. (Aceste reacții apar foarte rar). Nu ar trebui să vi se administreze vaccinul mai des decât la fiecare 10 ani în cazul în care ați experimentat o reacție locală severă.

Copilul meu s-a născut prematur; copilul meu va fi protejat contra tusei convulsive dacă mi s-a administrat vaccinul?

Este posibil ca bebelușii născuți înainte de 32 de săptămâni să nu fi primit suficienți anticorpi de la dumneavoastră în timpul perioadei intrauterine. Cu toate acestea, vaccinul va reduce riscul infecției bebelușului cu tuse convulsivă.

De asemenea, vă puteți proteja copilul prematur împotriva tusei convulsive:

- asigurându-vă că ceilalți copii din casă sunt complet vaccinați
- asigurându-vă că toți adulții din casă sunt complet vaccinați.



În cazul în care un membru al familiei nu a fost vaccinat împotriva tusei convulsive în ultimii 10 ani, ar trebui să i se administreze vaccinul cu 2 săptămâni înainte de contactul cu bebelușul.

Mi s-a administrat vaccinul în timpul sarcinii; copilul meu mai are nevoie de vaccinul împotriva tusei convulsive?

Da. Numărul de anticorpi pe care îi transferați bebelușului în perioada intrauterină scade rapid în primele șase luni de viață ale acestuia.

Așadar, este importantă administrarea la timp a vaccinurilor de rutină (care includ vaccinul contra tusei convulsive).

Vaccinul contra tusei convulsive este administrat tuturor copiilor în mod gratuit:

- ca parte a vaccinului 6-în-1, la 2, 4, 6 și 13 luni
- la 4-5 ani (ca parte a vaccinului 4-în-1)
- în primul an de școală secundară (vaccinul Tdap).

Dacă copilului dumneavoastră i se administrează aceste vaccinuri la timp, acesta va continua să fie protejat împotriva tusei convulsive.

Puteți afla mai multe informații despre vaccinul împotriva tusei convulsive accesând mychild.ie și immunisation.ie

Cum mă vaccinez?

Contactați medicul dumneavoastră de familie pentru a face o programare.

Dacă sunteți însărcinată, medicul dumneavoastră de familie vă poate administra gratuit vaccinul împotriva tusei convulsive.

Cu toate acestea, dacă medicul dumneavoastră de familie deține o clinică privată, acesta poate percepe o taxă pentru consultația în cadrul căreia vi se va administra vaccinul.

Publicat de: **HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)**

Data publicării: **Martie 2025**